

엔테리솔® 일리아이티스 (Enterisol® Ileitis)



동물용 의약품

효능 및 효과

돼지의 로소니아 인트라셀룰라리스(Lawsonia intracellularis) 감염에 의한 회장염(증식성 장염) 예방

원료약품 및 분량 (본제 1두분/2 mL 중)

Lawsonia intracellularis B3903:
10^{4.9}TCID₅₀ 이상

성상

미백색의 동결건조 생독 백신 분말과 투명한 멸균희석액

용법 및 용량

3주령 이상의 돼지에 대해 개체 경구 투약기 (드렌치)를 이용한 경구 접종법, 음수통을 이용한 음수 접종법으로 다음과 같이 접종한다.

- 1) 경구접종법(드렌치를 이용한 개체접종)
 - 동봉된 희석액으로 백신을 희석하여 두당 2 mL를 1회 경구 접종한다.
- 2) 음수 접종법
 - ① 백신은 접종 직전에 희석하여 준비한다.
 - ② 접종 전, 후 최소 72시간(3일) 동안 음수에 모든 약물, 살균제 및 소독제를 투여하지 않는다.
 - ③ 남아 있을 수 있는 항균제를 제거하기 위하여 염소 처리 하지 않은 물로 음수통을 세척한다.
 - ④ 다음 지시에 따라 백신을 희석하여 접종한다.
 - 접종할 두수에 따라 동봉된 희석액으로 백신을 희석한다.
 - 총 접종 대상 돼지의 체중에 따라 4시간 동안의 음수량을 다음과 같이 계산하여 준비한다. (아래 표 참조)
음수 1L당 2.5 g의 비율로 탈지분유를 혼합한 다음 이 혼합용액에 백신을 혼합한다.
 - ⑤ 희석된 백신은 4시간 이내에 모두 음수 접종하도록 한다.

| 돈근 총 체중 (돼지 두수 X 평균 돼지 체중(kg)) | 음수통 4시간 동안 추정 음수량*(L) |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 100 | 1.4 |
| 500 | 7 |
| 1000 | 14 |
| 2000 | 28 |
| 3000 | 42 |
| 4000 | 56 |
| 5000 | 70 |

* 4시간 동안 체중 100 kg당 음수량 1.4 L 기준

사용상의 주의사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것: 이전에 본제 또는 본제의 성분에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 일이 있는 돼지에는 사용하지 마십시오.
- 나. 부작용: 아나필락틱 쇼크가 나타날 수 있습니다. (해독제: 에피네프린)
- 다. 일반적 주의사항: 사용 전 건강상태를 확인하여 건강한 동물에만 사용하십시오.

라. 임신, 수유축, 신생축, 어린가축, 쇠약축 등에 대한 투여: 번식용 웅돈에는 접종하지 마십시오.

마. 적용상의 주의

- 백신 접종일로부터 3일 전후의 기간에는 항생제가 포함되지 않은 사료를 급여하십시오.
- 본 백신 접종시 사용하는 모든 기구는 백신의 불활화 및 제품 효능의 저하를 방지하기 위하여 항균제 및 소독제 잔류가 없어야 합니다.
- 백신 접종 전 반드시 백신의 성상을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
- 주변 온도 등에 따라 실제 음수량이 달라질 수 있으므로 4시간 동안의 음수량을 백신 접종 하루 전 미리 측정하여 백신에 사용될 정확한 음수량을 산정하십시오.
- 일단 개봉한 백신은 개봉 당일에 모두 사용하고, 용기와 사용하지 못한 내용물은 모두 소각하십시오.

바. 휴약기간: 도축 전 21일

사. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 말고 소각하여 폐기하십시오.

아. 기타

- 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 본제를 음수에 희석한 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 경우 재사용하지 마십시오.
- 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 동물용 의약품이므로 사람에게에는 절대 사용하지 마십시오.
- 접종시기 산정과 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

저장방법 및 유효기간

- 냉암소(2~7°C)에 보관
- 제조일로부터 24개월

포장 단위

20 mL (10두분), 100 mL (50두분)

제조사

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
St. Joseph, Missouri 64506 U.S.A.

수입사

베링거 인겔하임 동물약품(주)

서울시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩 16층 Tel : 080-516-2894

엔테리솔®일리아이티스(Enterisol® Ileitis)는 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록상표이며, 베링거인겔하임동물약품(주)는 한국에서 엔테리솔®일리아이티스(Enterisol® Ileitis)상표를 사용할 정당한 권한을 갖는 사용권자이다.