

# 이미티사이드

## 세계 유일의 심장사상충 치료제

### ● 심장사상충 치료방법

- 약물 치료법(성충구제제)
- 외과적 제거술: 중증 감염시, 대정맥 증후군 같은 합병증이 있거나 전신질환이 합병된 경우

### ● 성충구제제 이미티사이드(Immiticide®, Merial)


- 적어도 4개월 이상 된 미성숙 L5성충부터 구제 효과를 나타내며 비교적 안정화된 심장사상충 감염증(Class 1~3)의 치료제로 사용됩니다.

3번과 5번 요추 사이의  
허리근육 좌우에 근육주사

### ● 이미티사이드 치료요법

- Class 1, 2 : 24시간 간격으로 2회 주사
- Class 3 : 3회 주사(1회 주사 4~6주 후에 이틀 연속 24시간 간격으로 2회 주사)
- 자충구제도 병행되어야 합니다.
- 치료의 효과를 확인하기 위해서 치료 4~6개월 후 항원검사를 해야 합니다.

\* 주사량이 3ml 이상인 경우 두번으로 나누어 각기 다른 부위에 주사



### ● 증상에 따른 이미티사이드 투여방법

CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	CLASS 4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 잠재성 심장사상충 감염</li> <li>• 무증상 무병변</li> <li>• 예후가 좋다</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일반적증상</li> <li>• 약간의증상과전형적병변</li> <li>• 예후가 괜찮다</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심각한증상심한증상과 전형적인 병변</li> <li>• 예후가 나쁘다</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 매우심각한증상</li> <li>• 대정맥증후</li> <li>• 예후가 나쁘다</li> </ul>
이미티사이드를 체중 kg당 희석된 주사액 0.1ml 비율로 24시간 간격으로 2회 주사	이미티사이드를 체중 kg당 희석된 주사액 0.1ml 비율로 24시간 간격으로 2회 주사	대증용법 및 절대 안정, 1~2주 후 체중 kg당 희석된 주사액 0.1ml 비율로 1회 주사  증상이 개선된 1~2개월 후 체중 kg당 희석된 주사액 0.1ml 비율로 24시간 간격으로 2회 주사	사상충을 외과적으로 제거한 후 CLASS 3 방법으로 치료

#### 제품명

- 이미티사이드

#### 주성분

- Melarsomine dihydrochloride

#### 효능·효과

- 애완견의 심장사상충 구제

#### 포장단위

- 동결건조 분말과 바이알×5, 2ml 희석액 바이알×5/box

#### 유효기간 및 저장방법

- 제조일로부터 36개월 / 냉암소에 보관

#### 용법·용량

- 동결 건조된 분제에 동봉된 주사용 증류수 2ml를 가하여 용액을 만든 다음 아래 용량을 3번과 5번 요추 사이의 허리근육 좌우에 근육 주사한다
- 용량에 따른 체중별 주사량(2.5%용액)
- 체중 kg당 용액 0.1ml 사용
  - 체중 5kg 강아지의 경우 0.5ml 주사

#### 금기사항

- 임신중인가에서 사용하지 말 것
- 중감염된 개에게는 사용하지 말 것  
(우선 외과적으로 치료한 후 개의 상태에 따라 1-2개월 후 투약한다)

\* 자세한 사항은 제품안에 동봉된 사용 설명서를 확인하시기 바랍니다.