

Amoxicillin long acting  
Injectable suspension

**비바목스 엘에이®**  
**Bivamox LA®**

동물용의약품  
100mL

성분 및 함량 (본제 1mL중) :  
Amoxicillin Trihydrate .....150mg

**효능 · 효과**  
본제는 반합성 페니실린 제제인 아목시실린을 원료로 한 광범위 살균성 항생제로서 효과가 48시간 이상 유지되는 지속성 용성체이다.  
소, 양, 돼지, 개, 고양이와 포도상구균, 연쇄상구균, 파스퇴렐라, 헤모필루스, 살모넬라 등 그람양성균 및 그람음성균에 의한 호흡기, 소화기, 비노생식기, 피부 및 연조직 질환에 대한 예방 및 치료, 수술전후 감염의 예방 및 치료에 효과가 있다.

**용법 · 용량**  
소, 양, 돼지, 개, 고양이에 체중 10kg당 본제 1mL 근육 및 피하주사  
(필요에 따라 48시간 후 재주사)

**성상** : 희백색의 유성 현탁액

**주의사항**

- 1) 휴약기간
  - 우유 : 96시간 (착유우에 본제를 투여한 경우 주사 후 96시간에 경과하기 이전까지는 우유를 섭취하거나 식용으로 사용하지 말 것.)
  - 소/양/돼지 : 28일 (소, 양, 돼지에 본제를 투여한 경우에는 주사 후 28일이 경과하기 이전까지는 식용으로 도축 출하하지 말 것.)
- 2) 부작용 :
  - 때때로 국소반응이 나타날 수 있다.
  - 드물게 심각한 알러지 반응이 나타날 수 있다.
- 3) 금기사항
  - 페니실린과민증 동물에는 사용하지 말 것.
  - 토끼, 햄스터, 거니피에는 사용하지 말 것.
  - 정맥주사하지 말 것.
  - 얼리지 말 것.
- 4) 사용시 주의사항
  - 수의사의 지시에 따라 사용할 것.
  - 휴약기간을 준수할 것.

- 잘 흔들어서 사용할 것.
  - 한 부위에 본제 20mL 이상 주사하지 말 것.
  - 주사후 주사부위를 마사지할 것.
  - 무균적 방법으로 주사할 것.
  - 아목시실린의 가수분해를 피하기 위해 주사액 추출시 건조한 주사기 이용
  - 오 · 남용시 축산식품에 잔류할 수 있으므로 정해진 용법, 용량을 사용할 것.
  - 잘 흔들어 사용할 것.
- 5) 기타
- 접종자가 페니실린에 과민한 경우 제품을 취급하지 말 것.
  - 제품에 노출로 인해 발적, 얼굴 · 눈 · 입 종창, 노력성 호흡과 같은 증상 발현시 의사에게 조언을 구하며 제품 설명서를 보여줄 것.
  - 어린이의 손에 닿지 않도록 보관할 것.

**저장방법 및 유효기간** :  
건상양소에 보관 (20℃이하에서 보관)  
제조일로부터 2년

**제조사** : Norbrook Laboratories Ltd.(영국)  
Newry BT35 6JP, U.K.

**수입사** : **베링거 인겔하임 동물약품(주)**  
서울시 중구 남대문로 5가 84-11  
연세재단세브란스빌딩 16층  
Tel : 080-516-2894

Batch No.:

Manuf. Date:

Expiry Date:

