

생식기, 소화기 전문 속효성 진통, 진경제

# 복합부스코판®



Boehringer  
Ingelheim

## Buscopan® Compositum

동물용 의약품

### 원료약품 및 분량 (본제 1mL중)

(유효성분) 부틸스코폴라민브롬화물[EP] 4mg, 메타미졸나트륨[EP] 500mg (보존제) 페놀 5mg, (기타첨가제) 주사용수, 주석산

성상 얇은 황색 액체

### 효능 및 효과

- 말 : 산통, 복통, 식도경색, 분만후 산통, 설사 등의 보조치료
- 소, 송아지 : 장염 및 소화기 이상에 기인하는 통증, 설사, 식도경색, 산통, 기능적 고창증, 간산통 등의 보조치료
- 돼지 : 설사, 장염의 보조치료
- 개 : 설사, 장염의 보조치료

### 용법 및 용량

- 말 : 20-30mL, 정맥, 근육주사
- 소 : 20-25mL, 정맥, 근육주사
- 송아지 : 5-10mL, 정맥, 근육주사
- 돼지 : 5-10mL, 정맥, 근육주사
- 자돈 : 1-2mL, 정맥, 근육주사
- 개 : 1-2.5mL, 정맥, 피하, 근육주사

### 주의사항

- 1) 휴약기간 : 소, 말, 돼지 28일(착유우 사용금지)
- 2) 금기사항
  - Metamizole에 과민한 개체에 사용하지 말 것
  - 얼리지 말 것
- 3) 부작용
  - 드물게 과민성 반응이 일어날 수 있음 (해독제 : 에피네프린)
- 4) 사용상 주의사항
  - 수의사 또는 약사의 지시에 따라 사용할 것
  - 근육, 정맥주사시 천천히 접종할 것
  - 위장염시 병인에 따라 항생제 처치와 병용할 것
  - 오, 남용시 축산식품에 잔류 가능성이 있으니 정하여진 용법, 용량에 따라 사용 및 휴약기간을 준수하십시오.
  - 지정가축에만 사용할 것
  - 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하

십시오.

- 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 마시고, 안전하게 폐기처리하십시오.
- 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 일두일침을 원칙으로 접종하십시오.
- 본 제품은 동물전용어므로 사람에게는 사용하지 마십시오.
- 화농 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 지정된 경로를 통해 주사할 것
- 남용에 의한 약화사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의약품을 중복투여하지 마십시오.
- 본 약제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.
- 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 5) 기타 주의사항
  - 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
  - 사용자의 부주의로 사람에게 접촉시 즉시 사용설명서를 들고 의사와 상담하세요.

저장방법 건냉암소 보관

유효기간 제조일로부터 3년

포장단위 100mL/병

### 제조사

Labiana Life Sciences, S.A.  
Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228,  
Terrassa, Barcelona, Spain

### 수입사

베링거인겔하임동물약품(주)  
서울시 중구 통일로 10  
연세재단세브란스빌딩 16층  
(Tel : 080-516-2894)

▶ Buscopan®(부스코판®)은 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록 상표로, 베링거인겔하임동물약품㈜는 라이선스 사용권을 부여받아 사용중입니다.