

디아쿠어® 플러스 Diakur® Plus



동물용 의약품

특장점

- 신생 송아지 설사 예방 및 치료 보조제
- 천연섬유질(감귤펄프), 이스트 함유로 세균 흡착능력 우수
- 당, 전해질의 적절한 배합으로 효과적인 탈수 및 산증 교정
- 탁월한 기호성(감귤향)
- 빠른 치료효과

원료약품 및 분량(본제 100g중 g)

Dehydrated citrus pulp [별규]	15.000
Soy lecithin [USP]	5.994
Glucose [BP]	58.000
Sodium chloride [EP]	4.900
Sodium bicarbonate [EP]	4.000
Glycine [USP]	1.000
Tri-sodium citrate [EP]	2.000
Potassium chloride [USP]	2.000
Yeast(inactivated) [USP]	2.000
Sodium acetate [USP]	2.000
Silicon dioxide [USP]	2.200
Xanthan gum [USP]	0.700
Aromatic components [별규]	0.200
Ethoxyquin [별규]	0.006

성상 : 감귤류의 냄새가 나는 밝은 갈색의 분말

효능 및 효과

천연섬유질과 전해질의 합체로서 대장균, 로타/코로나 바이러스 등 미생물에 의한 송아지 설사의 예방 및 치료 보조제 (탈수 및 산증 완화)

용법 및 용량

- 송아지 체중 50kg 당 본제 100g을 따뜻한 물 2L에 잘 섞은 후 즉시 경구 투여
- 비합병증의 설사(uncomplicated diarrhea)시 치료기간동안 우유급이 가능(우유에 섞어 투약)
- 보조치료 : 8시간 간격으로 1~2일간 투여
- 예방 : 1일 1~2회 투여로 2~5일간 지속투여

주의사항

- 1) 휴약기간 : 없음
- 2) 금기사항 :

• 기립불능, 음수불능인 송아지에 사용금지

• 39°C 이상의 개체에 사용금지

3) 사용시 주의사항

- 우유에 혼합투여 또는 우유 대용투여는 단순성 설사의 경우에만 권장함
- 잘 지은후 즉시 투약할 것
- 투약후 48시간 후에도 송아지가 회복되지 않으면 수의사와 상담할 것
- 위관으로 투여시 고창증을 유발할 수 있음
- 수의사와 상담한 후 사용할 것
- 오, 남용시 축산식품에 잔류가능성이 있으나 정하여진 용법, 용량에 따라 사용할 것
- 지정된 가축에만 사용할 것
- 본 제품은 동물전용이므로 사람에게서는 사용하지 마십시오.
- 자동급수기(음수통)를 사용할 경우 약제투여 전후에 급수관(음수통)을 세척하십시오.

4) 기타

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관
- 사람이 삼킨 경우 즉시 설명서를 들고 의사를 찾을 것

유효기간 : 제조일로부터 24개월

저장방법 : 실온(1~30°C)에 보관할 것

포장단위 : 100g

제 조 사 : Boehringer Ingelheim Denmark A/S
DK - 2100 Copenhagen O, Denmark

수 입 사 : 베링거인겔하임 동물약품(주)

서울시 중구 통일로 10 연세재단 세브란스 빌딩 16층
TEL. (080)516-2894

* 디아쿠어®(Diakur®)는 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록상표로, 베링거인겔하임 동물약품(주)는 라이선스 사용권을 부여받아 사용중입니다.