

엔테리솔® 일리아이티스

(Enterisol® Ileitis)

동물용 의약품



효능 및 효과

돼지의 로소니아 인트라셀룰라리스(*Lawsonia intracellularis*) 감염에 의한 회장염(증식성 장염) 예방

원료약품 및 분량 (본제 1두분/2 mL 중)

Lawsonia intracellularis B3903:

10^{4.9}TCID₅₀ 이상

성상

미백색의 동결건조 생독 백신 분말과 투명한 멸균 희석액

용법 및 용량

3주령 이상의 돼지에 대해 개체 경구 투약기 (드렌치)를 이용한 경구 접종법, 음수통을 이용한 음수 접종법으로 다음과 같이 접종한다.

1) 경구접종법 (드렌치를 이용한 개체접종)
동봉된 희석액으로 백신을 희석하여 두당 2 mL를 1회 경구 접종한다.

2) 음수 접종법

- ① 백신은 접종 직전에 희석하여 준비한다.
- ② 접종 전, 후 최소 72시간(3일) 동안 음수에 모든 약물, 살균제 및 소독제를 투여하지 않는다.
- ③ 남아 있을 수 있는 항균제를 제거하기 위하여 염소처리 하지 않은 물로 음수통을 세척한다.
- ④ 다음 지시에 따라 백신을 희석하여 접종한다.
 - 접종할 두수에 따라 동봉된 희석액으로 백신을 희석한다.
 - 총 접종 대상 돼지의 체중에 따라 4시간 동안의 음수량을 다음과 같이 계산하여 준비한다. (아래 표 참조)
 - 음수 1당 2.5 g의 비율로 탈지분유를 혼합한 다음 이 혼합용액에 백신을 혼합한다.
- ⑤ 희석된 백신은 4시간 이내에 모두 음수 접종하도록 한다.

돈군 총 체중 (돼지 두수 X 평균 돼지 체중(kg))	음수통 4시간 동안 추정 음수량*(L)
100	1.4
500	7
1000	14
2000	28
3000	42
4000	56
5000	70

* 4시간 동안 체중 100 kg당 음수량 1.4 L 기준

사용상의 주의사항

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것: 이전에 본제 또는 본제의 성분에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 일이 있는 돼지에는 사용하지 마십시오.
- 나. 부작용: 아나필락틱 쇼크가 나타날 수 있습니다. (해독제: 에피네프린)
- 다. 일반적 주의사항: 사용 전 건강상태를 확인하여 건강한 동물에만 사용하십시오.

라. 임신, 수유축, 신생축, 어린가축, 쇠약축 등에 대한 투여: 번식용 웅돈에는 접종하지 마십시오.

마. 적용상의 주의

- 백신 접종일로부터 3일 전후의 기간에는 항생제가 포함되지 않은 사료를 급여하십시오.
- 본 백신 접종시 사용하는 모든 기구는 백신의 불활화 및 제품 효능의 저하를 방지하기 위하여 항균제 및 소독제 잔류가 없어야 합니다.
- 백신 접종 전 반드시 백신의 성상을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
- 주변 온도 등에 따라 실제 음수량이 달라질 수 있으므로 4시간 동안의 음수량을 백신 접종 하루전 미리 측정하여 백신에 사용될 정확한 음수량을 산정하십시오.
- 일단 개봉한 백신은 개봉 당일에 모두 사용하고, 용기와 사용하지 못한 내용물은 모두 소각하십시오.

바. 휴약기간: 도축 전 21일

사. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 휴약기간이 경과한 제품은 사용하지 말고 소각하여 폐기하십시오.

아. 기타

- 사용설명서를 충분히 읽은 후 사용하십시오.
- 본제를 음수에 희석한 후에는 가급적 빨리 사용하고 남았을 경우 재사용하지 마십시오.
- 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 동물용의약품이므로 사람에게에는 절대 사용하지 마십시오.
- 접종시기 산정과 만일의 경우를 위하여 사용 백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

저장방법 및 유효기간

- 냉장소(2~7°C)에 보관
- 제조일로부터 24개월

포장 단위

20 mL (10두분), 100 mL (50두분)

제조사

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.

St. Joseph, Missouri 64506 U.S.A.

수입사

베링거인겔하임 동물약품(주)

서울시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩 16층

Tel : 080-516-2894

엔테리솔®일리아이티스(Enterisol® Ileitis)는 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록상표이며, 베링거인겔하임동물약품(주)는 한국에서 엔테리솔®일리아이티스(Enterisol® Ileitis)상표를 사용할 정당한 권한을 갖는 사용권자이다.