

## 부 표

업 체 명 : 한국베링거인겔하임동물약품(주)	허가일자 : 2009. 10. 07.
제 품 명 : 플렉스 콤보(FLEXcombo)	변경일자 : 2018. 12. 20.
허가번호 : 제 128 - 149 호	: 2019. 01. 02.
	: 2019. 09. 04.
	: 2020. 06. 19.
	: 2020. 12. 07.
	: 2021. 04. 08.

### 1. 원료약품 및 분량 : 합제 1 두분(2 ml) 중

#### - 인겔백 써코플렉스

Porcine circovirus Type ORF-2-inactivated antigen ----- RP≥1.0

#### - 인겔백 마이코플렉스

*Mycoplasma hyopneumoniae* ----- RP≥1.0

### 2. 성 상

인겔백 써코플렉스 : 무색 내지 미황색의 투명한 주사제

인겔백 마이코플렉스 : 담홍~갈색의 주사제

### 3. 제조방법 : [별첨]

제조원의 제조방법에 따름.

### 4. 효능 및 효과

돼지 써코바이러스 Type 2 감염에 의한 돼지 써코바이러스 관련 질병의 예방과 마이코플라즈마 하이오뉴모니아 (*Mycoplasma hyopneumoniae*) 감염에 의한 유행성 폐렴의 예방

### 5. 용법 및 용량

각각의 백신을 사용 전 흔들어 동량으로 혼합한 다음 3~4주령 자돈에 2ml를 1회 근육접종

### 6. 포장단위

10두분, 50두분, 100두분, 250두분

### 7. 저장방법 및 유효기간

○ 2~7℃의 온도에서 보관(얼리지 말 것)

- 인겔백 써코플렉스 : 제조일로부터 24개월간 유효
- 인겔백 마이코플렉스 : 제조일로부터 24개월간 유효
- o 각 백신 중 빠른 유효일자

## 8. 주의 사항

- 휴약 기간: 도축 전 21일
- 드물게 아나필락틱 쇼크가 나타날 수 있으며, 이 경우 에피네프린이 권장됩니다.
- 다음의 경우에 사용하지 마십시오.(열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 동물, 이전에 본제 또는 본제의 성분에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 일이 있는 동물)
- 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 사용 전 건강상태를 확인하여 건강한 동물에만 사용하십시오.
- 백신 접종 전에는 반드시 백신의 성상을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
- 일단 개봉하여 혼합한 백신은 모두 사용하십시오.
- 사육환경 및 개체 차이에 따른 약효에 차이가 있을 수 있습니다.
- 사용한 빈 용기는 소독처리 하거나 소각하십시오.
- 접종 시기 산정과 만일의 경우를 위하여 사용 백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 접종일, 접종 장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하십시오.
- 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 제품을 혼합할 때, 누수가 생기지 않도록 완벽히 결합하고, 누수가 생긴 제품은 효능 및 효과가 저하될 수 있으므로 사용하지 마시기 바랍니다.

## 9. 기준 및 시험방법 : [별첨]

국가검정동물용의약품 생물학적제제 검정기준에 따른다.

## 10. 비 고

- 국가검정 동물용의약품
- 제조국 : 미국
- 제조사명 : Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.  
2621 North Belt Highway, St Joseph, Missouri 64506