

돼지 생식기 호흡기 중후군 생독백신

# 인겔백® 피알알에스 생독

(Ingelvac® PRRS MLV)

동물용 의약품



### 원료약품 및 분량

본제 1두분 (2 mL)중

PRRS-ATCC VR 2332 strain 10<sup>4.9</sup>TCID<sub>50</sub>이상

### 성상


백색의 동결건조 생독백신 분말과 멸균희석액

### 효능 및 효과

돼지의 생식기 호흡기 중후군 (PRRS)의 예방

### 용법 · 용량

- 자돈 : 3~18주령 돼지에 대해 2 mL를 1회 근육접종
- 번식돈군 : 농장 감염 상황에 따라 개별접종 또는 일괄접종
  - 개별접종 : 종부 3~4주전 2 mL를 1회 근육접종
  - 일괄접종 : 교배시기의 웅돈을 제외한 PRRS 항체 양성 번식돈군에 매 3~4개월 간격으로 2 mL를 근육접종
- 50두분 희석액(100mL) 사용방법 : 동봉된 희석액의 일부를 건조백신 바이알에 추가하여 잘 흔들어 섞은 다음, 희석액 병으로 다시 옮겨 나머지 희석액과 잘 혼합하여 총 용량이 100mL이 되게 한다.



### 주의사항

- 가. 다음 환축에는 투여하지 말 것
- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
  - 2) 열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 동물, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 동물에는 사용하지 마십시오.
  - 3) 종부령의 웅돈에는 사용하지 마십시오.
  - 4) 항체 음성인 양돈장에서는 백신을 사용하지 마십시오. (단, 특별한 경우에는 전문기관의 자문을 받아 백신 접종을 실시할 수 있습니다. 백신접종 후 최소 28일 까지 백신 바이러스의 동거축 전파 가능성이 있으며 상기 질병이 이미 침입한 양돈장의 경우에도 항체 음성인 모돈에 최초 백신 접종 시에는 분만을, 산자수 등이 다소 떨어질 경우가 있습니다.)

### 나. 부작용

- 1) 드물게 아나필락시스 쇼크가 나타날 수 있습니다. (해독제: 에피네프린)
- 2) 임신말기에 백신 접종된 모돈에서 태어나는 일부 자돈의 경우 백신 바이러스가 짧은 기간 배출될 수도 있으나, 백신 바이러스에 의한 어떠한 임상증상도 나타나지 않습니다.

### 다. 일반적 주의

- 1) PRRS 백신은 돈군의 현재 감염 바이러스의 균주, 전파상태, 발병력 및 면역 수준에 따라 효능이 달라질 수 있으므로 이를 고려하여 백신 접종 여부를 결정하십시오.

### 라. 적용상의 주의

- 1) 사용할 때 마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 2) 사용 전에 백신 전체가 25°C 전후가 되도록 유지한 후 사용하십시오.
- 3) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며, 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.
- 4) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사 부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
- 5) 주사 시 주사통증에 의해 접종자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의 하십시오.
- 6) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생 하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전·후 1주간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

### 마. 휴약기간 : 도축전 21일

### 바. 저장상의 주의사항

- 1) 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관 하십시오.
- 3) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 5) 개봉한 백신은 전량 사용하고 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소각하는 등 안전하게 폐기하십시오.

### 사. 기타

- 1) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 2) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽은 후 사용하십시오.
- 3) 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 4) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

### 저장방법

냉암소(2~8°C)보관

### 유효기간 제조일로부터 24개월

### 포장

20 mL (10두분), 100 mL (50두분)

### 제조사

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.  
St. Joseph, Missouri 64506 U.S.A.

### 수입사

베링거인겔하임동물약품(주)  
서울시 중구 동일로 10 연세재단 세브란스 빌딩 16층  
Tel : 080-516-2894

- 제품의 안전한 사용을 위해 첨부문서를 모두 읽은 후 사용하십시오.
- 인겔백®(Ingelvac®)은 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록상표로, 베링거인겔하임동물약품(주)는 라이선스 사용권을 부여받아 사용중입니다.