

Staphylococcus Aureus Bacterin

라백 스타프 (Lavac® Staph)

동물용의약품
50 mL/10 두분

원료약품 및 분량 본제 1두분 (5 mL) 중
Staphylococcus aureus Phage type I: 15%
Staphylococcus aureus Phage type II: 15%
Staphylococcus aureus Phage type III: 30%
Staphylococcus aureus Phage type IV: 30%
Staphylococcus aureus Phage type Misc: 10%

성상 유백색의 현탁액

효능 및 효과

건강한 정소의 황색 포도상구균(Staphylococcus aureus)에 의한 유방염의 예방

용법 및 용량

- 비유우 : 사용을 금함.
- 처녀우 : 착유우로 선발된 6개월령 이상의 처녀우에 대해서 최소 분만예정일 90일 전에 1차 5 mL를 근육접종하고 14일 후에 5 mL를 2차 근육접종한다. 매 건유기마다 1회 5 mL씩을 추가접종한다.
- 건유우 : 건유기에 1차 5 mL 근육접종한다. 다음 14일 뒤에 2차 5 mL를 재 근육접종한다

주의사항

- 1) 휴약기간 : 도축전 21일
- 2) 부작용 : 드물게 과민반응양 작용이 일어날 수 있음. (해독제:에피네프린)
- 3) 금기사항 : 비유중인 정소에는 사용을 금함.
- 4) 사용시 주의사항
 - 수의사 또는 약사의 지시에 따라 사용할 것.
 - • 남용시 축산식품에 잔류의 가능성이 있으니 정해진 용법 • 용량을 사용할 것
 - 지정된 가축(정소)에만 사용할 것
 - 황색 포도상구균에만 효과가 있고 다른 병원균과의 복합감염시에는 별도의 처치가 필요함.
 - 접종 전 충분히 흔들어서 사용하십시오.

- 일단 개봉하면 전량 사용할 것.
- 얼리지 마십시오.
- 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리하십시오.
- 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 일두일침을 원칙으로 접종하십시오
- 사육환경 및 개체차이에 따른 약효에 차이가 있을 수 있습니다.
- 면역억제성 질병을 앓고 있는 개체에서는 효과가 떨어질 수 있습니다.
- 본 제품은 동물전염이므로 사람에게는 사용하지 마십시오.
- 화농 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 지정된 경로를 통해 주사 할 것.
- 다음동물에는 투여하지 마십시오. 열이 있거나 영양장애가 심한 동물, 전염성 질병 및 기생충감염, 스트레스를 받은 동물, 이전에 본 백신에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 일이 있는 동물
- 백신을 접종하기 전에 온도가 상온(15-25°C)이 될 때까지 놓아두었다가 사용하십시오.
- 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 개봉한 백신은 전량 사용하고 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소독 또는 소각 하는등 안전하게 폐기하십시오.
- 5) 기타 주의사항
 - 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
 - 사용자의 부주의로 인해 사람에게 접종시 즉시 사용 설명서를 들고 의사를 찾을 것

저장방법

직사광선을 피하여 2°C~7°C 에서 냉장보관 할 것.

유효기간

제조일로부터 36개월간 유효.

• Lavac®는 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록상표로, 베링거인겔하임동물약품(㈜는 라이선스 사용권을 부여받아 사용중입니다.

제조사:

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
St. Joseph, Missouri 64506 U.S.A.
수입사:

서울시 중구 통일로 10
연세재단 세브란스빌딩 16층
Tel: 080-516-2894