



● 입증된 효과와 안전성의 통증관리 솔루션

☑수술 전후 ☑급만성 ☑통증 관절염(DJD)에는

**쉽고 빠른 메타캠® 4총사!**

**1** 주사액 10ml  
(개 / 고양이)



24시간의 효과, 주사제로 메타캠을 시작하세요!

현탁액 10/32ml  
(개) **2**



현탁액으로 처방하세요!  
꿀맛의 액상과 동봉된 실린지가 투약을 편안하고 정확하게!

**3** 현탁액 3ml  
(고양이 전용)



고양이 현탁액을 처방하세요!  
Oxidation 대사방식으로 고양이에게 더 안전하게!

츄어블 **4**



츄어블을 처방하세요!  
개별 블리스터 포장으로 간편하고, 쇠고기향 첨가로 기호성까지 (1정당 1MG의 높은 함량으로 중대형견의 통증 관리도 OK!)

**AAHA/AAFP 통증관리 가이드 NSAID 용법**

**⚡ 급성**  
복강 연부조직 수술    치과 수술

**⌚ 만성**  
정형 외과    병원 내 처치  
(방광카테터, 흉강/복강 천자 등)


개 DJD  
고양이 DJD

**개와 고양이의 진통 소염제**

현탁액, 주사액, 그리고 츄어블 정까지-  
반려동물의 다양한 통증, 메타캠®으로 관리하세요.

● 메타캠은 장기간의 치료에서도 통증에 관해서 지속적인 개선 효과를 보여줍니다.<sup>2</sup>

Reduction of clinical signs with METACAM<sup>2\*</sup>



- 0.2MG/KG 1일 1회 투여로 수술 전후, 급만성 24시간 통증 관리 가능<sup>1</sup>
- 다양한 제형으로 어떠한 상황에서도 OK!
- 장기간의 투여에도 안전함<sup>1,3</sup>
- 전용 주사기를 통해 보호자도 쉽고 정확하게 투여 가능 (전용 주사기는 유지 용량)
- 높은 기호성으로 입맛 까다로운 강아지도 고양이도 OK
- 유럽, 캐나다 호주에서 가장 많이 사용되고 있는 NSAID 제제<sup>4</sup>

Reference 1) Cegedim Veterinary Market Research for Australia/New Zealand; data on file, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. 2) Henderson AJ, Hackett IJ, Ganz H, Justus C. Clinical efficacy and tolerance of Metacam® for the long-term management of chronic locomotor disorders in the dog [in German]. Prakt Tierarzt. 1994;75(3):179-189. 3) Aragon CL, Hofmeister EH, Budsberg SC. Systematic review of clinical trials of treatments for osteoarthritis in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2007;230(4):514-521. 4) European Medicines Agency. METACAM® (meloxicam) Oral Suspension Summary of Product Characteristics. Ingelheim, Germany: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**제품명**

- 메타캠 주사액, 메타캠 1.0mg 츄어블정, 메타캠 현탁액, 메타캠 현탁액 0.5mg 고양이용

**성분·함량**

- 주사액 : 멜록시카 5.0mg/ml
- 현탁액 : 멜록시카 1.5mg/ml(10ml, 32ml), 0.5mg/ml(고양이용 3ml)
- 정 제 : 멜록시카 1.0mg/정

**성상**

- 주사액 : 투명한 노란색의 용액
- 현탁액 : 노란색의 점성 현탁액
- 정 제 : 베이지의 양면 볼록한 원형의 츄어블정

**효능·효과**

- 개** - 급성 또는慢성의 근골격계 질환에 의한 통증과 염증의 경감  
- 수술 후 통증과 염증의 경감
- 고양이** - 수술 후 통증 경감

\* 자세한 사항은 제품 안에 동봉된 사용 설명서를 확인하시기 바랍니다.

**포장단위**

- 주사액 : 10ml
- 현탁액 : 10ml, 32ml, 3ml(고양이용)
- 정 제 : 84정

**용법·용량**

메타캠® 용법 용량 안내	초기용량	유지용량	
용도(회/일)	함량 기준(mg)	함량 기준(mg)	
반려견	수술 후 통증 관리	주사: 0.04ml/kg 현탁액: 0.12ml/kg	현탁액: 0.06ml/kg
	근골격계 질환	0.2mg/kg	0.1mg/kg
반려묘	수술 후 통증 관리 / 급성 근골격계 질환	주사: 0.04ml/kg 현탁액: 0.4ml/kg	현탁액: 0.1ml/kg
	만성 근골격계 질환	0.1mg/kg	현탁액: 0.2ml/kg