

비스테로이드성 소염제

# 메타캠® 1mg 츠어블정

Metacam® 1mg chewable tablets for dogs

Meloxicam 1mg



애완용 동물용의약품 | 처방대상 동물용의약품

원료약품 및 분량(본제 1 정(800mg) 당)  
멜록시캠(Meloxicam, EP) ..... 1.0mg  
부형제..... 적량

성상 M10 이라고 새겨진 반점이 있는 베이지색의 양면 불룩한 원형의 츠어블정

### 효능 및 효과

- 대상동물: 애완용 개
- 급성 만성 근골격계 질환에 의한 통증경감과 염증의 치료

### 용법 및 용량

- 첫날은 체중 kg당 멜록시캠 0.2mg을 1회 경구투여
- 그 후 증상이 치료될 때까지 24시간 간격으로 1일 1회 체중 kg당 멜록시캠 0.1mg을 경구투여
- 메타캠® 1mg 츠어블정으로서 10 kg당 1정

### 주의사항

- 1) 휴약기간  
다른 소염제로 치료한 개체에서 부작용의 증가를 유발할 수 있으므로 바로 사용하지 말고 치료약물의 약동학적 특성을 고려하여 최소 24시간의 휴약기간을 가진 후 사용할 것
- 2) 부작용  
- 비스테로이드성 소염제의 전형적인 부작용인 식욕 상실, 구토, 설사, 혈변, 무기력의 증상이 나타날 수도 있다.  
- 매우 드물게 출혈성 설사, 토혈증, 위장궤양, 간효소 증가 등의 증상이 나타날 수 있다.  
- 부작용은 일반적으로 치료 첫주에 나타나고, 일시적이며 치료말기에는 사라진다. 그러나 아주 드물게 심각하거나 치명적일 수 있다.  
- 과량사용시 나타나는 부작용에 대해서는 대증치료가 선행되어야 한다.  
- 부작용 발생시 치료를 중단하고 수의사의 조언을 구한다.
- 3) 금기사항  
- 탈수, 저혈압 개체에 신장독성을 유발할 가능성이 있으므로 사용금지  
- 위장관계, 간, 심장, 신장의 이상을 가지고 있는 개체에 사용금지  
- 다른 비스테로이드성 소염제, 이노제, 항응고제, 부신피질호르몬제, 아미노글리코사이드계 제제와 병용투여시 독성 유발 가능성이 있으므로 병용금지  
- 임신 또는 비유 중 사용금지  
- 6주령 이하의 개체에 사용금지  
- 본 제품에 과민반응을 보이는 개체에 사용금지
- 4) 사용시 주의사항  
- 비스테로이드성 소염제에 민감한 개체에 사용을 피할 것.  
- 임상증상은 3- 4일 이내에 호전되며 치료 후 10일까지 증상의 호전이 보이지 않는 경우 사용을 중지해야 함.  
- 수의사의 지시에 따라 사용할 것.  
- 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 말 것.  
- 정확한 용량을 사용할 것.  
- 동물에만 사용할 것.  
- 사람이 복용 시 즉시 사용설명서를 들고 의사를 찾는다.  
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

### 저장방법 및 유효기간

- 실온(1- 30°C) 보관
- 호일 포장은 반드시 포장 상자에 넣어서 보관
- 제조일로부터 36개월

포장단위 7정, 84정, 252정

### 제조사

Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.  
Calle Maiz Np. 49, Barrio Xaltocan, C.P. 16090,  
Mexico D.F., Mexico

### 수입사

베링거인겔하임동물약품(주)  
서울시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩 16층  
Tel : 080- 516- 2894

- ▶어린이보호용 포장재이므로, 사용시 블리스터 안의 정제를 강하게 눌러서 개봉하십시오.
- ▶제품의 안전한 사용을 위해 첨부문서를 모두 읽은 후 사용하십시오.
- ▶메타캠®(Metacam®)은 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록상표이며, 베링거인겔하임동물약품(주)는 한국에서 메타캠®(Metacam®)상표를 사용할 정당한 권한을 갖는 사용자입니다.