

비스테로이드성 소염제

메타캠® 2%



Metacam® Solution for injection for cattle and pigs

Meloxicam 20mg/mL

처방대상 동물용의약품

원료약품 및 분량(본제 1mL중)

멜록시캠(Meloxicam, EP)..... 20mg

성상 투명한 노란색의 용액

효능 및 효과

비스테로이드성 소염제로 프로스타글란딘 합성을 억제하여 소염, 항상출, 진통, 해열작용

*소 :

- 송아지와 어린 소의 급성 호흡기 감염의 임상증상 완화 및 치료
- 일주일 이상의 송아지와 비착유우의 설사에 대한 임상증상 완화
- 급성 유방염의 항균제 치료 시 병용 보조요법제

*돼지 :

- 비감염성 보행 장애의 파행과 염증 증상을 감소
- 산후 패혈증과 임신중독증(유방염-자궁염-우유증 복합증)의 항균제 치료 시 병용 보조요법제

용법 및 용량

*소 :

- 급성 호흡기 감염: 항생제 처치와 더불어 체중 100kg당 2.5mL를 피하 또는 정맥을 통해 일회 접종
- 설사: 경구를 통한 재수화 요법과 병행하여 체중 100kg당 2.5mL를 피하 또는 정맥을 통해 일회 접종
- 급성 유방염: 항생제 처치와 더불어 체중 100kg당 2.5mL를 피하 또는 정맥을 통해 일회 접종

*돼지 :

- 항생제 처치와 병행하여 체중 100kg당 2mL를 근육주사하고 필요하면 24시간 이후 한번 더 주사한다

주의사항

1) 휴약기간: 소-도축 전 15일, 우유-

5일, 돼지-도축 전 5일

2) 금기사항

- 출혈성 위장관 장애, 간, 심장, 신장의 기능부전 및 출혈성 장애, 제품에 과민성이 있는 개체에 사용하지 말 것

3) 부작용

- 임상시험에서 10%미만의 개체에서 피하접종 후 주사부위의 경미한 종창을 보였다.
- 심한 탈수, 저혈량, 저혈압 개체에 신장독성 위험이 있으니 사용을 피할 것
- 매우 드물게 과민양 반응이 심각하게 나타나거나 폐사가 나타날 수 있다. (해독제 : 에피네프린)

4) 사용 시 주의사항

- 부신피질호르몬제, 기타 비스테로이드성 소염제, 항응고제와 병용하지 말 것.
- 과량사용 시 대증치료가 먼저 이루어져야 함.
- 유효기간이 경과한 후 사용하지 말 것.
- 얼리지 말 것.
- 수의사의 지시에 따라 사용할 것.
- 오·남용시 축산식품에 잔류가능성이 있으니 정하여진 용법, 용량에 따라 사용할 것.
- 사용 전 충분히 흔들어서 사용할 것.
- 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 일두일침을 원칙으로 접종할 것.
- 본 제품은 동물 전용이므로 사람에게 사용하는 사용하지 말 것.
- 화농 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 지정된 경로를 통해 주사할 것.
- 개봉 후 오염되지 않도록 주의할 것.

5) 기타 주의사항

- 실수로 인해 사람에게 접종 시 통증을 유발할 수 있음.
- 실수로 인해 사람에게 접종 시 즉시 제품설명서를 가지고 의사를 찾을 것.
- 비스테로이드제에 민감한 사람은 제품과의 접촉을 피할 것.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

저장방법 및 유효기간

- 유효기간: 36개월(개봉 후 28일)
- 직사광선을 피하고 25℃ 이하에서 보관(얼리지 말 것)

포장단위 50mL, 100mL

제조사

Labiana Life Science, S.A.
Venus 26, Can Parellada Industrial,
08228 Terrassa, Barcelona, Spain

수입사

베링거인겔하임동물약품(주)
서울시 중구 통일로 10
연세재단세브란스빌딩 16층
Tel : 080-516-2894

▶ 제품의 안전한 사용을 위해 첨부서류를 모두 읽은 후 사용하십시오.

▶ 메타캠®(Metacam®)은 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH가 소유한 등록상표로, 베링거인겔하임동물약품(주)는 라이선스 사용권을 부여받아 사용중입니다.