

백신의 혁명! 감보로병, 마렉병 예방 생동결백신

백시텍(VAXXITEK)

1. 기존 백신의 한계를 뛰어넘는 혁신적 백신
2. 세계적으로 입증된 안전성과 효능
3. 생산성, 균일도, 수익성의 극대화

Making the
vital difference

■ 성분 · 함량

1 수분당

전염성 F 낭병 바이러스(Paragher 주)의 VP2 유전자가 삽입된
마렉병 바이러스(HVT FC-126주)..... 3,880PFU이상
부형제..... 적당량

■ 효능 · 효과

- 닭에서 전염성 F 낭병 및 마렉병을 예방할 목적으로 사용합니다.

■ 용법 · 용량

- 400ml 백신 희석액에 피하접종의 경우 2,000수분의 백신 분량을, 난내
접종(In ovo)의 경우 4,000수분(Avitech), 8,000수분(Embrex)의 백신
분량을 희석하여 아래의 방법에 따라 접종하십시오.

〈In ovo접종법〉

- In-ovo 접종을 시작하기 전 In-ovo접종기 시스템의 작동방법을 숙지한다.
- 사용 전 후에 난내 주사 접종기(In-ovo injector)를 소독한다.
- 희석액에 혼합한 백신을 종란 접종기구별 권장용량(Avitech 0.1ml, Embrex 0.05ml) 씩 18~19일령의 건강한 종란에 접종한다.
- 희석액 안에 백신을 혼합한 후 1시간 이내에 전량 접종할 것.

〈피하 접종법〉

- 접종전, 접종기구는 121°C에서 최소 15분간 Autoclaving 혹은, 끓는 물에 20분
간에서 소독한다.
- 접종기를 화학적 소독제를 사용하여 소독하는 것은 금한다.
- 20~22 Gauge 3/8"-1/2" 길이의 바늘을 사용하여 마리당 0.2mL의 용량이
정확히 접종되도록 한다.
- 1일령의 병아리에 뼈와 근육을 피해 목뒤의 느슨한 피부를 잡고 주사한다.
- 희석액 안에 백신을 혼합한 후 1시간 이내에 전량 접종할 것.

■ 주의사항

- 건강한 닭에만 접종하십시오.
- 접종 시 오염이 없도록 무균시술 하십시오.
- 사람에게 부주의로 접종되었을 경우 즉시 전문의의 도움을 받으십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 얼리지 마십시오

■ 포장단위

1,000수분, 2,000수분, 4,000수분

■ 저장방법

- 앰플 : 액체 질소통에 보관
- 희석액 : 실온에 보관
- 질소통 : 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 인큐베이터나 병아리
상자 가까이에 두지 말 것.

■ 유효기간

제조일로부터 36개월



▶ 백시텍 VAXXITEK