

# 보렌



## 처방대상 동물용의약품

**원료약품 및 분량** 본제 100mL중  
덱사메타손 이소니코틴산염  
(Dexamethasone 21-isonicotinate,  
EP): 0.1g

**성상** 백색 또는 옅은 갈색 현탁액

### 효능 및 효과

소: 케토시스, 관절염, 활액낭염, 유방염, 기관지폐렴, 자궁염 등의 보조치료  
말: 건초염, 활액낭염, 질소노증, 관절염  
돼지: MMA, 관절염, 자간, 중독증, 수술 후쇼크예방  
개, 고양이: 습진, 이염, 관절염, 알레르기, 초기 추간원판질환  
모든 동물에서 항염증, 항알러지 및 중독에 대한 저항성을 증가시킬 목적으로 사용한다.

### 용법 및 용량

말, 소: 체중 100kg 당 2mL, 다만 소에 대한 유도분만 목적시는 개체당 20mL  
송아지, 성돈: 개체당 3-5mL  
자돈: 개체당 1-2mL  
개, 고양이: 개체당 1-2mL  
상기 용량을 근육, 피하주사한다.  
효능은 4일간 지속되므로 재접종 필요시 5일차에 접종한다.

### 주의사항

- 1) 휴약기간:
  - 소, 말, 돼지: 42일
  - 우유: 2.5일
- 2) 금기사항
  - 골다공증, 당뇨, 진행성 종양을 가진 개체에 접종하지 말 것.
  - 임신 후기 3개월에 접종하지 말 것
  - 감염시 사전 항생제 처치없이 사용하지 말 것
- 3) 부작용:
  - 드물게 과민반응이 나타날 수 있음 (해독제-에피네프린)
- 4) 사용시 주의사항
  - 수의사의 지시에 따라 사용할 것
  - 사용전 충분히 흔들어서 사용할 것

- 얼리지 말 것
- 오, 남용 시 축산식품에 잔류 가능성이 있으니 정하여진 용법, 용량에 따라 사용할 것
- 무균적인 방법으로 접종할 것(일두 일침 사용)
- 화농 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 지정된 경로를 통해 주사할 것
- 5) 기타 주의사항
  - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
  - 사용자의 부주의로 사람에게 접종시 즉시 설명서를 들고 의사를 찾을 것

**포장단위** 50mL/병

**저장방법** 건암소에서 표준온도(15-25℃)하에 보관할 것

**유효기간** 제조일로부터 3년

### 제조사

Labiana Life Science, S.A.  
Venus, 26 Can Parellada Industrial  
08228, Terrassa, Barcelona, Spain

### 수입사

베링거인겔하임동물약품㈜  
서울시 중구 통일로 10  
연세재단세브란스빌딩 16층  
Tel : 080-516-2894

▶ 제품의 안전한 사용을 위해 첨부문서를 모두 읽은 후 사용하십시오.

▶ Voren®은 **Boehringer Ingelheim**

**Vetmedica GmbH** 가 소유한 등록상표로, 베링거인겔하임동물약품(주)는 라이선스 사용권을 부여받아 사용중입니다.